


CAPÍTULO VII

RESULTADOS


Resultados iniciales

Perfil del paciente

El 52% de los pacientes fueron mujeres, mientras que el 48% restante fueron hombres. En cuanto a las edades, el rango de edad que más prevaleció fue de 25 a 36 años y, en segundo lugar, de 13 a 24 años, con 21% y 19%, respectivamente. El promedio de edad de los pacientes fue de 32.53 años.




En cuanto a las edades, no se encontró diferencia respecto al sexo, ya que el promedio de edad de los hombres fue de 32.51 años y el promedio de edad de las mujeres fue de 32.55 años.




Síntomas

Respecto a los síntomas, el vomito, mareo y pérdida del equilibrio son las formas de representación de la enfermedad principales con 19%, 18% y 18% respectivamente.

Con este dato se identifica la forma en la que los pacientes identificaron la enfermedad.



La duración de los síntomas en el paciente tuvo un promedio de 50.25 días. Si se analiza el periodo de días de los síntomas por bloques, se identifica que más del 36% duró 61 días o más con los síntomas, antes de asistir a recibir apoyo médico.




Por lo tanto, se puede identificar que los pacientes tuvieron un periodo prolongado de estadía con los síntomas, a pesar de que se identificaba claramente que había síntomas claros de una enfermedad.

Tratamiento

El 19% de los pacientes diagnosticados con vértigo migrañoso no tuvieron un tratamiento normal en la institución, debido a la falta de gravedad en la enfermedad, por lo que solamente se requirió de ejercicios y posturas que ayudarían a disminuir la enfermedad.


Sin embargo, el 81% de los pacientes si recibió un tratamiento formal en la institución. A pesar de ello, se considero al total de la muestra debido a que, de una u otra forma, se atendió la enfermedad.



Prevalencia del vértigo


Del total de pacientes revisados, se identificó que el 83% tuvo vértigo antes del tratamiento, aún cuando este no fue el síntoma principal por el que acudieron a revisión.

Analizando por sexo, se identificó que el 57.6% de las mujeres presentó vértigo antes del tratamiento, mientras que solo el 54.3% de los hombres tuvo este síntoma en ese periodo previo.




El 81% de los pacientes manifestó haber sufrido de vértigo durante el tratamiento, mientras que el 19% restante no.

Respecto al género, se identificó que el 49.51% de las mujeres si tuvo vértigo durante este periodo, mientras que el 54.98% de los hombres tuvo este síntoma en el mismo periodo de tiempo. Por lo que si existe diferencia significativa en la manifestación de este síntoma, respecto a hombres y mujeres.




En la manifestación de vértigo después del tratamiento se identifico que 77% si tuvo vértigo y el 23% no.

Identificando por género, se muestra que el 50.51% fueron hombres, mientras que el 52.10% de los que presentaron estos síntomas después del tratamiento fueron mujeres.



Respecto al tiempo que duro el tratamiento, en promedio se tuvo una duración de 48.13 días.


Si consideramos por bloques de periodos, el 38% de las personas tuvo que mantener el tratamiento por 61 a 90 días, como máximo.



Prevalencia del vértigo después del tratamiento

Dentro de los pacientes que manifestaron haber tenido el vértigo después del tratamiento, se identificó que, en promedio, manifestaron el síntoma 150 días.

Si se considera este dato por bloques de tiempo se identifica que no hay diferencia significativa entre los porcentajes de días en los que se manifestó el vértigo después del tratamiento.



Evaluación del Resultado

Se detecto a través de un análisis de correlación entre la presencia del vértigo antes y después del tratamiento que si existe una prevalencia del síntoma, dado que el 77% de los pacientes manifestó haber tenido vértigo después del tratamiento y que además se haya manifestado durante un periodo de tiempo promedio de 150 días. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de que no hay relación entre la prevalencia del vértigo y el cuadro de diagnóstico de la migraña.

De esta manera, se detecta que no hay un periodo de tiempo especifico para que el vértigo disminuya pero si existe una estrecha relación entre quienes ya tuvieron vértigo y quienes lo siguen presentando como síntoma de la enfermedad.