

CAPÍTULO VIII

DISCUSIÓN

A través del presente estudio se busco identificar la prevalencia del vértigo en los casos donde se presenta el cuadro de migraña, se tomaron muestras del servicio de otorrinolaringología del Hospital General Bicentenario de la Secretaría de Salud de Puebla; se conformaron 600 muestras viables en el periodo del 30 de Junio del 2013 al 01 de Agosto del 2014.

En dichas muestras se tomaron datos generales de los pacientes y datos estadísticos, tales como: la sintomatología de la migraña, la presencia del vértigo antes, durante y después del tratamiento, los periodos de tiempo antes y durante el tratamiento y los días que prevaleció el vértigo una vez terminado el tratamiento, en el caso de que haya prevalecido el síntoma.

Una vez recabadas las muestras, se llego al resultado de que el síntoma principal que tuvieron los pacientes fue el vómito, aunque el 83% manifestó haber tenido vértigo antes de tomar el tratamiento; durante el tratamiento el 81% de los pacientes manifestó el vértigo y una vez terminado el tratamiento el 77% siguió manifestando el síntoma.

Los pacientes, en promedio, esperaron 48.5 días con los síntomas para asistir a una revisión; igualmente, el tratamiento que recibieron duro en promedio 48 días; sin embargo, los pacientes que siguieron manifestando el síntoma reportaron, en promedio, 150 días más con el vértigo.

Por lo tanto, se realizó un análisis de correlación entre los síntomas antes y después del tratamiento, verificando que se tiene una estrecha relación entre ambas variables, por lo cual, si existe prevalencia del vértigo después de un cuadro de migraña.

Recomendaciones finales

Se recomienda la reconstrucción de más estudios en los cuales se analice toda la sintomatología que ocurre antes, durante y un cuadro de migraña, así como una inspección de largo plazo en estos pacientes para determinar cuáles son los síntomas que prevalecen cuando se termina el tratamiento y los motivos por los cuales se siguen manifestando