

11. ANEXOS

Clasificación clínica de Glucksberg para EICH aguda

Estadio	Piel	Hígado	Tracto gastrointestinal
1	Erupción maculopapular < 25% de la superficie corporal	Bilirrubina 1.98-2.92mg/dL	>500 mL diarrea/día
2	Erupción maculopapular 25-50% de la superficie corporal	Bilirrubina 2.98-5.96 mg/dL	>1000 mL diarrea/día
3	Eritrodermia generalizada	Bilirrubina 6.02-13.15 mg/dL	>1500 mL diarrea/día
4	Eritrodermia generalizada con formación de bulas y descamación	Bilirrubina >13.15 mg/dL	Dolor abdominal intenso con/sin íleo.

Grado	Gravedad de afección por órganos
I	Estadios 1-2 erupción cutánea; sin involucro intestinal ni hepático; sin disminución del desempeño clínico
II	Estadios 1-3 erupción cutánea; estadio 1 de tracto GI o/y hepático; disminución leve del desempeño clínico
III	Estadios 2-3 erupción cutánea; estadios 2-3 de tracto GI y/o estadios 2-4 hepático; disminución moderada del desempeño clínico
IV	Similar al grado II con estadios 2-4 de involucro orgánico y disminución grave del desempeño clínico

Índice de gravedad de IBMTR para EICH aguda

Índice	Afección cutánea		Afección hepática		Afección gastrointestinal	
	Estadio	Extensión de la erupción	Estadio	Bilirrubina total (µmol/L)	Estadio	Volumen de diarrea (mL/día)
A	1	<25%	0	<34	0	<500
B	2	25-50%	o 1-2	34-102	o 1-2	550-1500
C	3	>50%	o 3	103-225	o 3	>1500
D	4	Bullas	o 4	>225	o 4	Dolor abdominal intenso e íleo