


### III. Resultados

Los resultados obtenidos del análisis de los datos fueron los siguientes:

Figura1. **Niveles de Autoestima en pacientes con Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria y Diálisis Peritoneal Automatizada**



**Figura 1**

En la figura 1 se puede observar que los pacientes que utilizan el tratamiento DPCA al inicio presentaron una Baja Autoestima de 9.7 tomando en cuenta que se encuentra por debajo de la media establecida en el cuestionario de Autoestima. Los pacientes que utilizaban el tratamiento DPA al inicio presentaron una Autoestima moderada de 14.9. Al igual que los pacientes que ya llevaban 6 meses de tratamiento con DPCA de 14.1. Sin embargo se puede observar que los pacientes que llevaban 6 meses de tratamiento con DPA fueron los que presentaron una Alta Autoestima.

También se puede observar que los pacientes que iniciaban los tratamientos presentaron una baja autoestima y los pacientes que ya llevaban 6 meses utilizando los tratamientos presentaron una autoestima moderada.

Figura 2. **Niveles de Depresión en pacientes con Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria y Diálisis Peritoneal Automatizada**




Figura 2

En la figura 2 podemos observar que los pacientes que se encuentran al inicio del tratamiento presentaron una Depresión Grave de 57.1 tomándolo en cuenta en la medición de la prueba de zung. Los pacientes que se encontraban al inicio del tratamiento con DPA presentaron una Depresión Moderada de 51, al igual que los pacientes que llevaban 6 meses con DPCA de 54.4. Los pacientes que llevaban 6 meses de tratamiento con DPA no presentaron depresión.

Los pacientes que iniciaban los tratamientos presentaron una Depresión moderada de 54.05 y los pacientes que llevaban 6 meses con los tratamientos manifestaron una Depresión leve de 46.9.

**Tabla 1. Análisis de varianza: Autoestima**

Comparaciones Múltiples				
DMS				
			Diferencia medias (I-J)	Significación
Variable dependiente	Grupos			
AUTOESTIMA	1	2	-5,2	0,06
		3	-4,4	0,11
		<b>4</b>	<b>-8,7</b>	<b>0,00</b>
	2	1	5,2	0,06
		3	0,8	0,77
		4	-3,5	0,20
	3	1	4,4	0,11
		2	-0,8	0,77
		4	-4,3	0,11
	4	<b>1</b>	<b>8,7</b>	<b>0,00</b>
		2	3,5	0,20
		3	4,3	0,11

En la tabla 1 observamos la diferencia de medias de autoestima, entre diferentes grupos de pacientes.

El grupo 1 representa a pacientes al inicio del tratamiento que utilizan DPCA.

El grupo 2 representa a pacientes al inicio del tratamiento que utilizan DPA.

El grupo 3 representa a pacientes con 6 meses de tratamiento que utilizan DPCA.

El grupo 4 representa a pacientes con 6 meses de tratamiento que utilizan DPA.

El grupo 4 presenta una autoestima significativamente mayor que el grupo 1.

**Tabla 2 Análisis de varianza: Depresión**

Comparaciones Múltiples				
DMS			Diferencia medias (I-J)	Significación
Variable dependiente	Grupos			
DEPRESIÓN	1	2	6,1	0,07
		3	2,7	0,41
		4	17,7	0,00
	2	1	-6,1	0,07
		3	-3,4	0,30
		4	11,6	0,00
	3	1	-2,7	0,41
		2	3,4	0,30
		4	15	0,00
	4	1	-17,7	0,00
		2	-11,6	0,00
		3	-15	0,00

En la tabla 2 observamos la diferencia de medias de depresión, entre diferentes grupos de pacientes.

El grupo 1 representa a pacientes al inicio del tratamiento que utilizan DPCA.

El grupo 2 representa a pacientes al inicio del tratamiento que utilizan DPA.

El grupo 3 representa a pacientes con 6 meses de tratamiento que utilizan DPCA.

El grupo 4 representa a pacientes con 6 meses de tratamiento que utilizan DPA.

El grupo 4 presenta una depresión significativamente menor que los otros grupos.